



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЦА

ПРОФИЛАКТИКА УКУСА КЛЕЦА



Если живете в эндемичном по клещевому энцефалиту **районе**, начинайте вакцинироваться* в феврале (по ускоренной схеме) или осенью (по обычной схеме), после комплекса трех прививок повторная вакцинация каждые три года.



Надевайте светлую одежду, на которой насекомое будет хорошо видно




При походе в лес надевайте рубашку с длинными рукавами с резинками (можно для волос) и поднятым воротником, заправленные в сапоги или носки брюки, убирайте волосы под косынку или другой головной убор



Используйте репелленты (для животных также есть специальные репелленты) или хотя бы гвоздичное масло



Осматривайте себя и домашнее животное после похода в лес



Скашивайте траву на дачном участке



С собой нужно всегда иметь антисептики – хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод, чтобы обработать место укуса после удаления клеща, бинт и пластырь, а также специальный инструмент для извлечения клеща (продается в аптеке)

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЦА

Если вы находитесь в эндемичном районе по клещевому энцефалиту, и у вас нет самой высокой защиты – прививки, то следует незамедлительно обратиться к врачу.

Рекомендуется введение иммуноглобулина в течение 96 часов с момента присасывания.

Если район не эндемичен по клещевому энцефалиту, то с обращением к врачу можно подождать до следующего дня.

Клеща нужно полностью снять сразу после обнаружения, рану обработать антисептиком и закрыть бинтом или пластырем.

Чем быстрее снят клещ, тем меньше вероятность, что произойдет заражение, но 100-процентной гарантии, что заражение не произойдет, никто не может дать.

Если не можете извлечь клеща самостоятельно, надо обратиться к хирургу, или узкопрофильному специалисту с хирургическими навыками, а далее – к терапевту или в самом лучшем варианте врачу-инфекционисту.

Если после самостоятельного извлечения клеща его частички остались, то лучше обратиться к специалисту сразу, чтобы избежать инфицирования места присасывания.



КЛЕЩ УКУСИЛ В ЭНДЕМИЧНОМ ПО КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ РАЙОНЕ



Есть действующая прививка от клещевого энцефалита*?

НЕТ

ДА

Ввод иммуноглобулина в течение 96 часов**

Помните:
на клещевой энцефалит антибиотики не действуют!

Можно не волноваться

КЛЕЩ УКУСИЛ В НЕЭНДЕМИЧНОМ ПО КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ РАЙОНЕ



Клещ был сдан в лабораторию?

НЕТ

ДА

Обращение к врачу, профилактический короткий курс антибиотиков тетрациклинового ряда**



Боррелиоз обнаружен?

НЕТ

ДА

Проверить антитела на боррелиоз на 17-21 день

Обращение к врачу для предписания курса антибиотиков**



*Узнайте подробнее о сроках проведения вакцинации против клещевого энцефалита на сайте Роскомнадзора

**Имеются противопоказания, обратитесь к врачу.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

<https://fondpravmir.ru/pervaya-pomoshh-pri-ukuse-kleshha/>